

平成 29 年産から水稲もち品種「きぬはなもち」の種子販売が開始されます！

平成 29 年産の一般栽培から、県認定品種（奨励品種に準ずる品種）に採用された水稲もち品種「きぬはなもち」の種子販売が開始されます。「きぬはなもち」の栽培性は、従来の水稲もち品種「モチミノリ」と概ね同様ですが、加工したもちはなめらかで柔らかく、食味に優れています。

栃木県では、「モチミノリ」の後継品種として、「きぬはなもち」への切り替えを進めていきます。




写真 1 成熟期の様子（左：モチミノリ、右：きぬはなもち）

表 1 栽培特性と収量性（奨励品種特性表から引用）

品種名	出穂期 (月日)	成熟期 (月日)	稈長 (cm)	穂長 (cm)	穂数 (本/㎡)	10a 当たり 玄米重(kg)	玄米 千粒重(g)
きぬはなもち	8.11	9.29	83	21.4	306	638	21.8
モチミノリ	8.12	10.02	85	22.0	342	613	21.9

(栽培地は宇都宮市。移植時期は 5 月上旬)

表 2 品種特性（奨励品種特性表から引用）

品種名	耐倒 伏性	耐冷性	穂発 芽性	ふ先色	芒の 多少・ 長短	病虫害			
						葉 いもち	穂 いもち	縞葉 枯病	白葉 枯病
きぬはなもち	やや強	やや弱	難	淡褐	稀短	やや強	強	極強	やや強
モチミノリ	中	やや弱	やや難	赤褐	稀短	中	やや強	極強	中

表 3 加工関連データ（奨励品種審査会資料から引用）

品種名	もちの白度 (WB)	破米率 (%)	もちの硬化性
きぬはなもち	39.8	4.0	IV (やや硬化しにくい)
モチミノリ	38.9	7.8	III (中程度)

※白度 (WB) : 白さを表す値で、値が大きい程白い。